

**III Ciclo de Palestras do Conselho Regional de Farmácia do Estado de  
Goiás  
“Farmácias Notificadoras”**

**Exercício 1:**

Paciente A.C., 32 anos, masculino, deu entrada no serviço de emergência do hospital A no dia 15/04/07 em decorrência de uma fratura do pé esquerdo devido a uma partida de futebol.

Após redução da fratura e imobilização com gesso tipo bota, o paciente estava se queixando de muitas dores e o ortopedista perguntou se já tinha utilizado diclofenaco alguma vez, mas A.C. não sabia dizer. Foi prescrito diclofenaco de sódio 100 mg ao dia v.o. por 5 dias.

A.C. foi a uma farmácia de seu bairro e adquiriu com seu farmacêutico o medicamento receitado. Dois dias depois, A.C. retornou a farmácia para reclamar ao farmacêutico que “aquele medicamento” estava lhe fazendo muito mal, pois ele estava com mal estar e “dor forte na boca do estômago”.

O farmacêutico suspeitou de RAM e recomendou imediato atendimento médico. No hospital, A.C. foi encaminhado para um gastroenterologista, que procedeu a um exame endoscópico. Após ser questionado quanto ao consumo de álcool, A.C. revelou ter “tomado duas doses de cachaça” 1 hora depois de ter tomado o diclofenaco.

O laudo do exame evidenciou hemorragia digestiva. O gastro internou A.C. Após uma semana outro exame endoscópico foi realizado, sendo constatado remissão completa da hemorragia, e A.C recebeu alta hospitalar.

- a) O evento relatado pode ser uma RAM? Por que?**
- b) Se afirmativo, notifique o caso preenchendo o formulário de notificação adequado.**

**Exercício 2:**

Paciente L.M., 3 anos, feminino, foi diagnosticada com amigdalite há 24 horas, tendo sido prescrito amoxicilina suspensão oral de uma determinada marca comercial (medicamento similar). A dose prescrita foi de 5 mL (125 mg) de 8

em 8 horas. Após 72 horas a paciente apresentou piora dos sintomas, com febre e presença de placas purulentas.

Desfechos:

**Desfecho 1** – Após uma semana, a mãe de L.M. retorna à farmácia e relata ao farmacêutico que sua filha voltou ao posto de saúde e precisou tomar Penicilina injetável devido à piora de seu quadro clínico. A menina já estava bem melhor.

**Desfecho 2** – A mãe retorna à farmácia e adquire amoxicilina de outra marca recomendada pelo médico. O estado clínico da criança melhora.

- a) **Preencha o formulário de notificação adequado, considerando apenas o 1º desfecho.**
- b) **Qual informação deveria ser incluída na notificação no caso do 2º desfecho?**
- c) **Identifique quais fatores que podem ter levado à inefetividade relatada**
- d) **Quais perguntas o farmacêutico deveria ter feito à mãe de L.M. para averiguar a presença desses fatores?**

**Exercício 3:**

Paciente G.T.A., 22 anos, feminino, foi ao pronto-socorro do hospital A no dia 04/07/08 devido a uma faringite recorrente. O médico receitou penicilina benzatina, que foi aplicada no mesmo dia. Algumas horas depois de deixar o hospital, G.T.A. notou o aparecimento de algumas “bolinhas” em seu rosto que coçavam bastante, mas não deu muita importância, acreditando ser uma alergia simples, visto que já havia desenvolvido um quadro semelhante com o uso anterior de antibióticos. No dia seguinte, as pápulas eritematosas haviam se espalhado por todo o corpo da paciente, que estava com forte sensação de queimadura e muitas dores. G.T.A. decidiu voltar ao pronto-socorro, sendo internada com diversas lesões e vesículas em todo o corpo e mucosas. O médico diagnosticou o caso como Síndrome de Stevens Johnson. Paciente relatou que havia feito uso de dipirona 4 dias antes do ocorrido. Três semanas depois, a paciente recebeu alta.

- a) **Notifique este caso preenchendo o formulário de notificação adequado.**

**Exercício 4:**

Paciente L.V. 52 anos, feminino, chega à farmácia portando uma receita de diclofenaco injetável. Ao adquirir o medicamento o balconista informa que possui curso de aplicador de injeção e oferece seus serviços. A paciente, que sofrendo de dor muscular muito forte, aceita a oferta.

O balconista então pergunta em qual braço L.V. prefere que seja aplicada a injeção. “No esquerdo”, diz a paciente.

A dor muscular cede ao antiinflamatório, porém ocorre uma forte dor e um inchaço no local da aplicação. Após alguns dias, o braço de L.V. fica assim:



- a) **Qual tipo de problema relacionado ao medicamento pode ser observado neste caso?**
- b) **Em qual etapa do ciclo do medicamento ocorreu o problema?**
- c) **Preencha o formulário de notificação adequado.**
- d) **Quais providências podem ser adotadas para que evitar esse problema?**